

Handkarte Medikamente SAA BPR 2019		
Wirkstoff	Handelsname	Indikation und Dosierung
Acetylsalicylsäure	Aspisol, ASS	-akutes Koronarsyndrom: Erw.: 1x 250mg langsam i.v. -keine Repetition!
Amiodaron	Cordarex	-Reanimation: Erw.: nach 3. Defibrillation 300mg i.v. - Kind: nach 3. Defibrillation 5mg/kg KG -Repetition nach 5. Defibrillation Erw. 150mg, Kind: 5mg/kg KG
Atropin	Atropinsulfat	-instab. Bradykardie: Erw.: 0,5mg i.v. (Repetition nach 3-5min, wenn wirkungslos → keine Repetition!, max. 3mg!!)
Butylscopolamin	Buscopan, BS	-kolikartige Schmerzen: Erw.: 0,3mg/kg KG langsam i.v. -max. 20mg!!, sofern Max.-Dosis nicht erreicht, Repetition nach 5 Minuten möglich
Dimenhydrinat	Vomex	-Nausea/Emesis: Erw. u. Kind >14J.: 62mg langsam i.v. Kind <14J: 20mg rect. (Suppositorium)
Dimentinden	Fenistil	-Anaphylaxie: Erw. u. Kind >12J.: 4mg langsam i.v. -einmalige Repetition 4mg iv. Möglich
Epinephrin	Adrenalin, Suprarenin	-Reanimation: Erw.: 1mg i.v./i.o., Kind: 0,01mg/kg KG i.v./i.o. alle 4 Minuten -instabile Bradykardie: 1mg in 100ml verdünnen (0,01mg/ml) 0,5ml/Min. i.v. -Anaphylaxie ab II°: Erw. u. Kind >12J.: 0,5mg i.m. Kind 6-12J: 0,3mg i.m., Kind <6J.: 0,15mg i.m. -Kruppsyndrom: 2mg mit 2ml NaCl/Aqua dest. Vernebeln
Esketamin	Ketanest-S	-traumatolog. Schmerz NRS ≥6, >30kg KG! -Kombi mit Midazolam dringend erforderlich! zuerst Midazolam! -0,125mg/kg KG titriert(!) i.v., falls NRS weiter ≥6 weitere fraktionierte Gabe i.v., max: 0,25mg/kg KG!!
Furosemid	Lasix	-Lungenödem >12J.: 20mg langsam i.v., einmalig Repetition nach 15min. Möglich
Glukose	Glucose	-Hypoglykämie <60mg/dl: Erw. u. Kind >30kg: 8-10g i.v. - Kind: 10-12kg: 2,6g i.v., 12-15kg: 3,2g i.v., 15-19kg: 4,0g i.v., 19-24kg: 5,0g i.v., 24-30kg: 8,0g i.v.
Glyceroltrinitrat	Nitrolingual	-AKS/Hypertensiver NF/Myokardinfarkt/Linksherzinsuff.: Erw. u. Kind >12J.: 1x0,4mg (1Hub) sublingual -einmalige Repetition nach 5 Minuten möglich
Heparin		-AKS: 5000I.E. i.v. -keine Repetition
Ibuprofen	Aktren, Neuralgin	-traumatolog./unklarer Schmerz NRS≥6: 7-9kg, 6-11Mon.: 50mg, 10-15kg, 1-3J.: 100mg, 16-19kg, 4-5J.: 150mg, 20-39kg 6-11J.: 200mg, >40kg, >12J.: 10mg/kg KG

Handkarte Medikamente SAA BPR 2019		
Wirkstoff	Handelsname	Indikation und Dosierung
Ipratropiumbromid	Atrovent	-Asthma bronch./COPD: Erw. u. Kind >12J.: 0,5mg vernebeln -Repetition nach 30min. möglich
Lidocain	Xylocain	-Anlage i.o.-Zugang bei wachem Patienten: Erw.: max. 40mg langsam über 120Sek. i.o. - Säugling/Kind: 0,5mg/kg KG langsam über 120Sek. i.o. -Max.-Dosis: 40mg!!
Midazolam	Dormicum	-Krampfanfall: Erw.: 0,1mg/kg KG i.v. (1x Repetition mögl.), 0,2mg/kg KG nasal per MAD (1x Repetition mögl.), 10mg in 2,0ml buccal, max. 20mg, Kind: 3-11Mon.: 2,5mg in 0,5ml buccal, 1-4J.: 5,0mg in 1ml buccal, 5-9J.: 7,5mg in 1,5ml buccal, 10-17J.: 10mg in 2,0ml buccal, keine Repetition! Max. 10mg!! -Analgesiedierung mit Esketamin: Erw. u. Kind >30kg und <50kg: 1mg Erw. u. Kind >50kg: 2mg Erw. >60J., <50kg KG: 1mg
Naloxon	Narcanti	-Opiatintoxikation >12J.: fraktionierte Gabe in 0,04mg Schritten bis Schutzreflexe vorhanden
Paracetamol	Perfalgan	-Schmerzen NRS ≥6: Kind <12J.: rektale Applikation: 7-12kg, 6-24mon.: 125mg, 13-25kg, 2-8J.: 250mg, 26-43kg, 8-12J.: 500mg Erw. u. Kind >12J.: Kurzinfusion: 10-50kg KG 15mg/kg KG >50kg KG 1000mg, einmalige Kurzinfusion über 15 Minuten
Prednisolon	Solu Docortin H	-Bronchialobstruktion, Kruppsyndrom: Erw. u. Kind >12J.: 100mg i.v., Kind <12J 100mg rect. -Anaphylaxie: Erw. u. Kind >12J.: 250mg i.v., Kind <12J.: 100mg rect.
Salbutamol		->2J.: Asthma bronchiale/COPD: Erw. u. Kind >12J.: 2,5mg Kind 5-12J.: 2,5mg, Kind 3-4J.: 1,25mg, Kind 2J.: 0,6mg -mit 6-8L O2 vernebeln, 1x Repetition nach 10 min. mögl.
Urapidil	Ebrantil	-hypertensiver Notfall/Schlaganfall (RR sys >220mmHg) >12J: 5mg über 1min. i.v., titriert bis RR sys <220mmHg -akutes Aortensyndrom: 5mg über 1 min., titriert bis RR sys <160mmHg, RR sys nicht <120mmHg, max. 25mg!!
VEL	Jonosteril	-Hypovolämie/Anaphylaxie/Hyperglykämie: Erw. u. Kind >12J.: 500-1000ml i.v., Kind <12J.: 10ml/kg KG i.v. -Schlaganfall mit RR sys <120mmHg: Erw. u. Kind >12J.: 500-1000ml i.v.

(nach SAA NRW 2019 Stand 3.10.2018, © Christin Scherf)